

SPSS veri analizi, Klinik Psikoloji Bölümü tez hazırlama ve yazdırma, Psikoloji Bölümü ölçek bulma, etik kurul başvuru formu hazırlama, intihal oranı düşürme, intihal raporu alma, tez, seminer ve bitirme projesi hazırlama ve yazdırma, tartışma, sonuç ve öneriler bölümü hazırlama, tezi makaleye çevirme, tezden makale oluşturma, intihal raporu alma, tez sunumu hazırlama, tez sunum örnekleri, tez düzenleme vb. tüm akademik işlemlerinizde yaşadığınız problemler için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

0532 674 54 95

bilgi@tezimiduzenle.com

3. İş kapasitesi belirgin şekilde azalmıştır ve zaman zaman hasta kontrolünü kaybeder. İşi bırakmalı ve hasta olarak kabul edilmelidir. Hastaneye yatırılırsa, gün içinde birkaç saat servis aktivitelerine katılabilir.

4. Hasta hastaneye yatırılır (ya da yatırılmalıdır) ve servis aktivitelerine katılamaz.

B. Haftalık değerlendirme

0: a) hasta normal aktivite düzeyine geri döner.

b) hastanın normal aktivitesine dönüşünde güçlük yoktur.

1: a) hasta çalışıyor fakat motivasyonun değişmesine bağlı olarak çabası biraz azalmış.

b) hastanın distraktibilitesi ya da motivasyonunun değişmesine bağlı olarak normal çalışmasına tamamen dönüp dönemeyeceği belli değil.

2: a) hasta çalışıyor ancak tedavi edilmeyen epizodlar nedeni ile belirgin ölçüde düşük düzeyde.

b) hasta halen hastanede yatıyor ya da halen hasta olarak kabul ediliyor, sadece yakın süpervizyon ya/ya da zamanın kısıtlanması gibi özel önlemlerle işine dönebilir.

3: hasta halen hastanede yatıyor ya da hasta olarak kabul ediliyor ve işine dönemiyor. Hastanede gün içinde birkaç saat servis aktivitelerine katılıyor.

4: hasta halen hastanede yatıyor ve genellikle servis aktivitelerine katılmıyor.

BECK ANKSİYETE ENVARTERİ

Beck tarafından geliştirilmiş, Ulusoy ve arkadaşları tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Ölçeğin geçerlilik güvenilirlik cronbach alfa katsayısı 0. 94, test tekrar test katsayısı ise r=57 olarak belirtilmiştir.

17-80 yaş grubunda anksiyete sorunsalını taramak amacıyla geliştirilmiş olan ölçek toplam 21 sorudan oluşmaktadır ve dördümlü Likert tipi puanlama ile cevaplanır. Puanlanırken “önemli değil=0 puan”, “fazla rahatsız etmedi=1puan”, “orta derecede=2 puan” ve “ağır=3 puan” şeklinde yapılmaktadır. Anksiyete ölçeğinden alınacak maksimum puan 63’ tür. 0-7 düşük seviyede anksiyete, 8-15 orta seviyede, anksiyete, 16-25 ağır seviyede anksiyete, 26-65 şiddetli seviyede anksiyete olarak tanımlanmaktadır.

Beck Anksiyete Ölçeği Soruları

Aşağıda insanların kaygılı ya da endişeli oldukları zamanlarda yaşadıkları bazı belirtiler verilmiştir. Lütfen her maddeyi dikkatle okuyunuz. Daha sonra, her maddedeki belirtinin bugün dahil son bir (1) haftadır sizi ne kadar rahatsız ettiğini yandakine uygun yere (x) işareti koyarak belirleyiniz.

	Hiç	Hafif düzeyde Beni pek etkilemedi	Orta düzeyde Hoş değildi ama katlanabildim	Ciddi düzeyde Dayanmakta çok zorlandım
1. Bedeninizin herhangi bir yerinde uyuşma veya karıncalanma				
2. Sıcak/ ateş basmaları				
3. Bacaklarda halsizlik, titreme				
4. Gevşeyememe				
5. Çok kötü şeyler olacak korkusu				
6. Baş dönmesi veya sersemlik				
7. Kalp çarpıntısı				
8. Dengeyi kaybetme duygusu				
9. Dehşete kapılma				
10. Sinirlilik				
11. Boğuluyormuş gibi olma duygusu				
12. Ellerde titreme				
13. Titreklilik				
14. Kontrolü kaybetme korkusu				
15. Nefes almada güçlük				
16. Ölüm korkusu				
17. Korkuya kapılma				
18. Midede hazımsızlık ya da rahatsızlık hissi				
19. Baygınlık				
20. Yüzün kızarması				
21. Terleme (sıcaklığa bağlı olmayan)				