

CORNELL DEMANSTA DEPRESYON ÖLÇEĐİ

SPSS veri analizi, Klinik Psikoloji Bölümü tez hazırlama ve yazdırma, Psikoloji Bölümü ölçek bulma, etik kurul başvuru formu hazırlama, intihal oranı düşürme, intihal raporu alma, tez, seminer ve bitirme projesi hazırlama ve yazdırma, tartışma, sonuç ve öneriler bölümü hazırlama, tezi makaleye çevirme, tezden makale oluşturma, intihal raporu alma, tez sunumu hazırlama, tez sunum örnekleri, tez düzenleme vb. tüm akademik işlemlerinizde yaşadığımız problemler için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

0532 674 54 95

bilgi@tezimiduzenle.com

Cornell Scale for Depression in Dementia ismi ile Alexopoulos ve arkadaşları tarafından demanslı hastalardaki depresif belirtileri, hasta ve bakım verenden alınan bilgiler doğrultusunda daha iyi tanımak amacıyla geliştirilmiş olan ölçek, Amuk ve arkadaşları tarafından Türkçeye uyarlanmış, geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmıştır. Türkçe formunun eşik değeri 7/8 olarak belirlenmiştir. Yazarlar ölçek toplam puanının yeterli bir test tekrar test tutarlılığı ($r: 0.93$) gösterdiğini ve yüksek iç tutarlılık saptadıklarını, ölçeğin cronbach alfa değerinin 0.86 olduğunu ayrıca ölçeğin 9 ve 19'uncu sorularda düşük düzeyde

test tekrar test tutarlılığı ($r < 0.30$) ile 6 ve 9'uncu soruların ölçek toplam puanı ile düşük düzeyde korelasyon ($r < .30$) saptadıklarını belirtmişlerdir.

Ölçek toplam 19 maddeden oluşmaktadır. Sorular hastadaki şiddetine göre 0-2 puan arasında değerlendirilir. Duygudurumla ilişkili bulgular, davranışsal değişiklikler, fiziksel bulgular, döngüsel fonksiyonlar ve düşünsel değişiklikleri değerlendiren beş alt boyutu vardır. Maddelerin puanlarının toplanması ile ölçek toplam puanı hesaplanır.

Cornell Demansta Depresyon Ölçeği (CDDÖ) Soruları

A. Duygudurum ile ilişkili bulgular			
1. Anksiyete (Huzursuz görünüm, derin düşünceli görünüm, kaygılı hal)			
2. Üzüntü (Üzgün yüz görünümü, üzgün ses tonu, ağlamaklı hal)			
3. Sevinçli olaylara tepki vermeme			
4. İrritabilite (Kolayca öfkelenme, kısa süreli gevşeme)			
B. Davranış değişiklikleri			
5. Ajitasyon (Huzursuz beden dili, ellerini sıkma, saçını çekme)			
6. Retardasyon (Hareketlerde yavaşlama, yavaş konuşma, yavaşlamış reaksiyon)			
7. Çok sayıda fiziksel yakınma (Yalnız gastrointestinal yakınmalar varsa 0 puan)			
8. İlgi kaybı (Her zamanki aktivitelere ilgide azalma)			
(Değişiklik akut olarak örneğin 1 aydan kısa süredir var ise puan verilir)			
C. Fiziksel bulgular			
9. İştah kaybı (Her zamankinden az yemek yeme)			
10. Kilo kaybı (1 ayda 2.5 kg'dan fazla kayıp varsa 2 puan)			
11. Enerji kaybı (Kolay yorulma, aktiviteyi sürdürememe)			
(Değişiklik akut olarak örneğin 1 aydan kısa süredir var ise puan verilir)			
D. Döngüsel fonksiyonlar			
12. Duygudurumda diurnal değişiklik (Semptomlar sabahları daha kötüdür)			
13. Uykuya dalmakta güçlük (Her zamankinden geç uykuya dalma)			
14. Uykudan sık uyanma			
15. Sabah erken uyanma (Her zamankinden erken uyanma)			
E. Düşünsel değişiklikler			
16. Özkıyım (Hayatı yaşamaya değer bulmama, intihar düşüncesi ya da girişimi)			
17. Zayıf özgüven (Kendini suçlama, değersiz bulma, başarısızlık/beceriksizlik duygusu)			
18. Kötümserlik (Kötülük beklentisi)			
19. Duygudurum ile uyumlu sanrılar (Yoksulluk, hastalık, kayıp sanrıları)			