

SOMATOFORM DISSOSİYASYON ÖLÇEĞİ (SDQ)

SPSS veri analizi, Klinik Psikoloji Bölümü tez hazırlama ve yazdırma, Psikoloji Bölümü ölçek bulma, etik kurul başvuru formu hazırlama, intihal oranı düşürme, intihal raporu alma, tez, seminer ve bitirme projesi hazırlama ve yazdırma, tartışma, sonuç ve öneriler bölümü hazırlama, tezi makaleye çevirme, tezden makale oluşturma, intihal raporu alma, tez sunumu hazırlama, tez sunum örnekleri, tez düzenleme vb. tüm akademik işlemlerinizde yaşadığınız problemler için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

0532 674 54 95

bilgi@tezimiduzenle.com

Nijenhuis ve arkadaşları tarafından 1996 yılında Somatoform Dissociation Questionnaire (SDQ) ismi ile geliştirilmiş olan ölçek, Şar ve arkadaşları tarafından 1998

yılında geçerlilik ve güvenilirliği yapılarak ülkemize kazandırılmıştır. Ölçeğin iç tutarlılığı için cronbach alfa katsayısı 0.94, Gutmann yarım test değeri $r=0.92$, madde-toplam puan korelasyonları 0.50-0.78 arasında, test tekrar test güvenilirliği $r=0.95$ olarak saptanmıştır.

Bedensel dissosiyasyon belirtilerini taramak amacıyla kullanılan ölçek, bireyin kendi kendisini değerlendirdiği bir öz bildirim aracıdır. Toplam 20 sorudan oluşan ölçeğin cevapları 1 ile 5 arasında değişen bir matrisde puanlanır. Bu puanların toplanması ile ortalama toplam puan elde edilir. Kesme puanı 40 olarak belirlenmiştir. 40 ve üzerinde olan puan alan kişilerde bir dissosiyatif bozukluk bulunma olasılığı yüksek olarak yorumlanır.

Somatoform Dissosiyasyon Ölçeği (SDQ-20) Soruları

Lütfen aşağıdaki sorularda belirtilen durumların sizdekine ne kadar uyduğunu değerlendiriniz ve her soru için buna uyan cevabı işaretleyiniz.

(1) Hayır (2) Biraz (3) Orta derecede (4) Çok (5) Tam

SORULAR	HAYIR	BİRAZ	ORTA DERECEDE	ÇOK	TAM
1.Bazen sanki vücudum ya da vücudumun bir bölümü yok oluyor gibi geliyor.	1	2	3	4	5
2.Bazen bir süre felç oluyorum.	1	2	3	4	5
3.Bazen konuşamaz hale geliyorum ya da ancak güçlkle ya da fısıltı halinde konuşabiliyorum.	1	2	3	4	5
4.Bazen vücudum ya da vücudumun bir bölümü acı hissetmez oluyor.	1	2	3	4	5
5. Bazen idrar yaparken acıyor.	1	2	3	4	5
6. Bazen kısa bir süre için gözlerim görmüyor, sanki kör oluyorum.	1	2	3	4	5
7. Bazen idrar yaparken tutukluk oluyor.	1	2	3	4	5
8.Bazen kısa bir süre için kulaklarım işitmiyor, sanki sağır oluyorum.	1	2	3	4	5
9.Bazen yakınımıdaki sesleri sanki çok uzaktan geliyormuş gibi duyuyorum.	1	2	3	4	5
10.Bazen bir süre için her yanıma katılıyor.	1	2	3	4	5
11.Bazen nezle olmadığım halde koku alma hissim her zamankine göre azalıyor ya da çoğalıyor.	1	2	3	4	5
12.Bazen cinsel organlarımda ağrı oluyor (cinsel ilişki dışında)	1	2	3	4	5

13.Bazen havaleye benzer bir bayılma nöbeti geçiriyorum.	1	2	3	4	5
14.Bazen normalde sevdiğim bir kokudan hoşlanmaz oluyorum.	1	2	3	4	5
15.Bazen normalde sevdiğim bir yiyeceğin tadından hoşlanmaz oluyorum (kadınlarda hamilelik dışında).	1	2	3	4	5
16.Bazen çevremdeki eşyaları her zamankinden farklı görüyorum (örneğin sanki bir tünelden bakıyormuş gibi ya da bakılan şeyin yalnız bir bölümünü görmek gibi).	1	2	3	4	5
17.Bazen gece boyunca uyuyamadığım halde gündüz gayet zinde oluyorum.	1	2	3	4	5
18.Bazen yiyecekleri yutamıyorum ya da yutmakta büyük zorluk çekiyorum.	1	2	3	4	5
19.Bazen insanlar ve eşyalar olduklarından daha büyük görünüyorlar.	1	2	3	4	5
20.Bazen vücudum ya da vücudumun bir bölümü hissiz oluyor	1	2	3	4	5